

Základní pravidla prevence šíření infekční žloutenky



Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců roku 2016 došlo v Jihomoravském kraji k epidemickému výskytu infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A, VHA). Epidemie probíhá i v dalších krajích České republiky. Nelze vyloučit také možnost šíření v kolektivu dětí školního zařízení.

Žádáme Vás tímto na základě žádosti Krajské hygienické stanice Zlínského kraje o spolupráci ve věci včasné prevence šíření této nákazy.

Děkujeme za spolupráci.

Základní pravidla prevence šíření infekční žloutenky:

1. Zásadní prevencí je důsledné dodržování hygieny rukou, t.j.:
 - mytí rukou teplou vodou a mýdlem,
 - po každém použití WC,
 - před konzumací každého jídla,
 - po návratu z venkovního prostředí,
 - po použití veřejné dopravy apod.
2. Zcela nevhodné je pít z jedné lahve (t.j. zejména otírání hrdla lahve rukou), společné ukusování svačín, sdílení cigaret.
3. Pro případ, kdy si nelze ruce řádně umýt, být vybaven pohotovostním balením gelu na ruce nebo jednorázovými desinfekčními ubrousky.
4. Vhodným preventivním opatřením je očkování proti hepatitidě typu A, které se provádí na žádost, za úhradu (provádí praktický lékař, očkovací centra).
5. Preventivní očkování proti hepatitidě typu A naléhavě doporučujeme všem žákům, kteří se vzdělávají v potravinářských oborech (pokud jsou očkovaní, pak v případě kontaktu s nakažou jsou chráněni a nemusí být vyloučeni z provozu).